



Les oiseaux rares au Maroc

Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine

Numéro 10 (2004)

Patrick BERGIER ⁽¹⁾, Jacques FRANCHIMONT ⁽²⁾, Michel THEVENOT ⁽³⁾
et la Commission d'Homologation Marocaine

⁽¹⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

⁽²⁾ Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 - 50.000 Meknès V.N. (Maroc)
j.franchimont@iam.net.ma

⁽³⁾ EPHE, Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 Montpellier Cedex 5 (France)
thevenot@univ-montp2.fr

Summary

In 2004, MRBC examined 43 records of which 32 were accepted. These included the first Moroccan records of a Cape Verde Shearwater, a Lesser Scaup and a Masked Shrike.

This year, MRBC received the first files for an Andalusian Hemipode, a Red-necked Phalarope

Introduction

43 demandes d'homologation ont été transmises à la Commission d'Homologation Marocaine en 2004. Une présentait une observation réalisée en 1986, une en 2001 (nouvelle analyse du dossier 01/24), une en 2002, 11 en 2003 et 29 en 2004. Nous remercions tous les observateurs qui ont communiqué leurs observations au

Prof. Jacques Franchimont
Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22
50.000 Meknès V.N. (Maroc)

qui assure le Secrétariat de la Commission.

and an Eastern Olivaceous Warbler; also noteworthy are the records of a Sooty Shearwater along the Mediterranean coast, the 4th record of a Grey-headed Gull and the 5th and 6th records for both Great northern Diver and Iceland Gull.

Trente deux données ont été acceptées par la Commission. Les 11 autres n'ont pu être homologuées, la plupart par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations, de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées.

La liste des espèces à soumettre à homologation a été revue ; elle est disponible sur www.go-south.org.

Présentation des données

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996).

La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique,
- Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du sixième rapport de la CHM (Bergier *et al.* 2000c) et rappelés ci-après :

RB (*Resident breeder*) - Sédentaire
BM (*Breeding migrant*) - Estivant nicheur
OB (*Occasional breeder*) - Nicheur occasionnel
FB (*Former breeder*) - Nicheur disparu
PM (*Passage migrant*) - Migrateur au long cours
WV (*Winter visitor*) - Hivernant
OW (*Occasional winter occurrence of regular migrant species - BM, PM*) - Présence hivernale occasionnelle d'une espèce habituellement estivante nicheuse ou migratrice au long cours
AV (*Accidental visitor, up to 30 records*) - Visiteur accidentel, moins de 30 données
F (AV) (*Former accidental visitor, not recorded since 1899*) - Visiteur accidentel, plus noté depuis 1899
? (*Indicates a doubt over the status immediately preceding the question mark, but not of occurrence*) - Indique un doute sur le statut concerné.

Pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la CHM et le nombre d'individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM),
- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date de création de la CHM (données du présent rapport exclues) et publiées dans les neuf premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996 - 2004), et le nombre d'individus correspondant,
- les deux derniers représentent le nombre de données reprises dans ce présent rapport n°10 de la CHM et le nombre d'individus correspondant.

Pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

Liste systématique des données acceptées

Plongeon imbrin – Great Northern Diver *Gavia immer* AV (3/3, 1/1, 2/2)
2004 (04/09) **Haha**, Cap Rhir. Immature de premier hiver. 11 janvier (H. Dufourny *et al.*)
2004 (04/25) **Haha**, Aghroud. Photos. 2 avril (A. van den Berg *et al.*)

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres précisions si nécessaires, date(s) d'observation, observateur(s).

- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc » disponible sur www.go-south.org.




Figure 1. Régions et sous-régions du Maroc (d'après Thévenot *et al.* 2003)

Troisième et quatrième mentions dans la région d'Agadir (concernent-elles le même individu ?) après celles d'autres oiseaux de premier hiver obtenues fin 1986 à l'estuaire du Souss (Bergier *et al.* 2000a) et fin 1989 dans le port d'Agadir (Thévenot, Vernon & Bergier 2003).

Puffin du Cap Vert – Cape Verde Shearwater
Calonectris (diomedea) edwardsii AV ou PM/OW
? (0/0, 0/0, 1/2)

2001 (01/24) **Souss**, Embouchure du Souss, 19 mars. 2 oiseaux.

Cette observation qui n'avait pas été homologuée en 2001 (Bergier *et al.* 2002) a été revue à la suite de la nouvelle documentation disponible sur cette (sous-) espèce, et en particulier des excellents clichés récemment parus, par exemple sur le site www.magikbirds.com.

Il s'agit de la première observation dans les eaux côtières marocaines de cette (sous-) espèce endémique des Iles du Cap Vert, qui est régulièrement observée en mer autour de cet archipel et au large du Sénégal dans la zone d'upwelling, surtout en octobre (Hazevoet, 1997). C'est aussi en octobre qu'ont eu lieu les trois mentions connues des Iles Canaries (Martin & Lorenzo 2001). Il est probable qu'elle fréquente aussi, au moins occasionnellement, la zone d'upwelling située au large du Sahara occidental et du Maroc méridional. Dans ce secteur où les Puffins cendrés des sous-espèces *diomedea* et *borealis* sont réguliers, une attention particulière devrait lui être portée.

Cette (sous-) espèce dont les critères d'identification ont été synthétisés par Porter *et al.* (1997), est légèrement plus petite que le Puffin cendré (*Calonectris diomedea*). Sa calotte et son manteau sont d'un brun plus sombre, contrastant plus fortement avec les parties inférieures. La gorge et le menton sont blanchâtres ; le bec est plus fin et plus sombre que celui du Puffin cendré.

Puffin fuligineux – Sooty Shearwater *Puffinus griseus* PM, OW (0/0, 1/1)

2003 (03/27) **Plaines du Maroc Oriental**, Melilla. Adulte. 1 novembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Le Puffin fuligineux est rare dans le détroit de Gibraltar ; aucune mention n'était connue sur la côte méditerranéenne marocaine. La CHM a décidé de considérer les observations de cette espèce sur cette côte seulement. Plus à l'est dans le bassin méditerranéen, il n'y a aucune mention récente pour l'Algérie (Isenmann & Moali 2000), seulement une en Tunisie et à Malte et deux en Sicile (Isenmann *et al.* 2005).

Butor étoilé – Bittern *Botaurus stellaris* PM, WV, FB, BM? (1/1, 1/1)

2003 (03/30) **Plaines du Maroc Oriental**, Embouchure Oued Moulouya. Adulte. 21 décembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

L'hivernage à l'embouchure de l'Oued Moulouya avait été rapporté en 1983 (Thévenot, Vernon & Bergier 2003), mais on n'avait plus eu de mentions depuis.

Grande Aigrette – Great White Egret *Ardea alba* WV (16/19, 5/8)

2003 (03/28) **Plaines du Maroc Oriental**, Barrage Mohamed V. Adulte. 2 novembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2003 (03/29) **Plaines du Maroc Oriental**, Barrage Mohamed V. Immature. 19 décembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2003 (03/35) **Dadès-Draa**, Barrage Mansour Eddahbi, Ouarzazate. 2 adultes. 8 février (H. Dufourny *et al.*)

2004 (04/07) **Plaines du Maroc Oriental**, Barrage Mohamed V. 2 adultes. 1 février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2004 (04/08) **Dadès-Draa**, Barrage Mansour Eddahbi, Ouarzazate. 2 adultes. 6 janvier (H. Dufourny *et al.*)

Encore une belle série d'observations, correspondant toutes à la sous-espèce paléarctique *alba* dont les effectifs nicheurs en Europe centrale ont considérablement augmenté depuis les années 1980, phénomène suivi de la colonisation de l'Europe de l'ouest. L'espèce est maintenant d'occurrence hivernale annuelle au Maroc.

Un des deux oiseaux observés le 8 février 2003 au Barrage Mansour Eddahbi (dossier 03/35) était toujours sur les lieux le 13 avril (dossier 03/20, A. Blomdahl *et al.* in Bergier, *et al.* 2004) ; étaient-ce les mêmes qui y sont retournés un an plus tard (dossier 04/08) ?

Au début des années 2000, les effectifs hivernants se sont accrus de manière très significative dans le nord-est de l'Algérie (Samraoui & Houhamdi 2002).

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck *Aythya collaris* AV (9/13, 5/5, 1/1)

2004 (04/16) **Moyen Atlas Occidental**, Dayet Affenourir. Mâle adulte. 5 avril (V. Schollaert *et al.*)

15° observation marocaine, sur un lac de montagne où on ne s'attendrait pas à rencontrer une espèce nord-américaine, mais il est vrai que trois observations ont déjà eu lieu à l'intérieur des terres dont une à Douyiet près de Fès et deux sur le Barrage Hassan Addakhil près d'Errachidia (Bergier & Thévenot 2004).

Fuligule à tête noire – Lesser Scaup *Aythya affinis* AV (0/0, 1/1)

2004 (04/17) **Moyen Atlas Occidental**, Dayet Affenourir. Femelle adulte. 5 avril (V. Schollaert *et al.*)

Première observation marocaine et, probablement, d'Afrique continentale, réalisée à une date très tardive. Sept mentions ont en revanche été enregistrées sur les Iles Canaries (Martin & Lorenzo 2001) et une sur les Iles du Cap Vert (Hazevoet 1999).

L'espèce est fort semblable au Fuligule milouinan (*Aythya marila*), aussi bien chez le mâle que la femelle, quoique légèrement plus petite et avec une tête moins arrondie (petite bosse à l'arrière du crâne avec ébauche de huppe).

Harle huppé – Red-breasted Merganser *Mergus serrator* WV (1/2, 4/8)

2003 (03/32) **Plaines du Maroc Oriental**, Embouchure Oued Moulouya. Femelle adulte. 21 décembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2004 (04/03) **Plaines du Maroc Oriental**, Sebkhah bou Areg. Mâle adulte. 25 janvier (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2004 (04/04) **Plaines du Maroc Oriental**, Sebkhah bou Areg. Femelle adulte. 8 février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2004 (04/06) **Plaines du Maroc Oriental**, Sebkhah bou Areg. 1 mâle et 4 femelles, adultes. 30 janvier (J. Franchimont & F. Touati Malih)

Belle série d'observations sur l'est de la côte méditerranéenne. L'espèce y semble assez régulière, les mentions s'échelonnant de novembre à début mars (Charco *et al.* 1995).

Aigle raviseur – Tawny Eagle *Aquila rapax* RB (7/8, 1/1)

2004 (04/26) **Bas Draa**, Ouaraoun, 10 km sud de Goulimine. Oiseau de deuxième année. 13 janvier (P. Laaksonen)

Les mentions dans le Bas Draa sont moins nombreuses que celles en provenance des régions situées immédiatement plus au nord (Souss et piémonts occidentaux des Haut et Anti Atlas). Celle-ci est la première soumise à la CHM, mais nous connaissons 7 mentions précédentes d'août à novembre et de février à avril (Thévenot, Vernon & Bergier 2003). Elles concernent vraisemblablement surtout des individus immatures erratiques en dispersion post-nuptiale.

Faucon kobez – Red-footed Falcon *Falco vespertinus* AV (18/ca 29, 3/4, 1/1)

2003 (03/34) **Collines du Maroc Oriental**, Debdou. Adulte. 2 mai (G. Hilgerloh & G. Nikolaus)

La date est classique du passage printanier au cours duquel a lieu l'essentiel des observations marocaines de l'espèce : 18 contre 4 à l'automne (Thévenot *et al.* 2003, Bergier *et al.* 2002, 2003, 2004).

Faucon de Barbarie – Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* RB mal connu (44/51, 4/6)

2004 (04/15) **Souss**, Embouchure Oued Souss. Adulte. 12 avril (V. Schollaert *et al.*)

2004 (04/23) **Atlas saharien**, Plaine de Tamlelt, Bouarfa. Adulte. 18 mai (O. Fontaine, V. Liéron *et al.*)

2004 (04/24) **Anti-Atlas Oriental**, entre Agdz et Tazenakht. Juvénile. Photo. 25 avril (D. Philippe, J.M. Guilpain *et al.*)

2004 (04/27) **Souss**, vallée du Souss. 2 adultes + 1 juvénile. Photos. 14 janvier (H. Huhtinen & P. Laaksonen)

Lieux classiques.....



Falco pelegrinoides juv. – Plaine du Souss, 14 janvier 2004 (H. Huhtinen & P. Laaksonen)

Turnix mugissant – Andalusian Hemipode *Turnix sylvaticus* RB (0/0, 1/1)

2004 (04/02) **Doukkala**, près Oualidia. 10 janvier (H. Huhtinen & P. Laaksonen)

L'espèce est maintenant rare au Maroc, quoique probablement sous-enseignée du fait de ses mœurs secrètes. Il s'agit de la treizième mention enregistrée dans les Doukkala et de la première soumise à la CHM. Depuis 1988, date des dernières observations publiées pour le Maroc (Thévenot, Vernon & Bergier 2003), nous avons eu écho de plusieurs mentions réalisées dans cette même région, vraisemblablement la seule où l'espèce se maintient dans le pays, mais aucune n'a été communiquée à notre Commission.

Marouette ponctuée – Spotted Crake *Porzana porzana* PM, OW (5/11, 1/1)

2004 (04/01) **Tafilalt**, Merzouga. 1 janvier (J. Franchimont)

L'espèce est rare en hiver (seulement 9 mentions de fin novembre à mi-février - Thévenot, Vernon & Bergier 2003). Elle n'avait été citée qu'une fois en hiver du Tafilalt (2 à Errachidia le 4 février 1981 - Thévenot *et al.* 1982) où elle est également rare à l'automne mais régulière au printemps.

Phalarope à bec étroit – Red-necked Phalarope
Phalaropus lobatus AV (0/0, 1/1)

2004 (04/05) **Plaines du Maroc Oriental**, Sebkhah bou Areg. Premier hiver. 25 janvier - 8 février (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Deuxième mention sur la côte méditerranéenne et première analysée par la CHM. Il n'y a que peu de mentions le long de la côte atlantique entre Oualidia et Massa, une seule dans le détroit de Gibraltar et une autre sur la côte méditerranéenne (près des Iles Chaffarines, 17 août - Tåning 1933).

Mouette à tête grise – Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus* AV (3/3, 0/0, 1/1)

2004 (04/11) **Souss**, Embouchure Oued Massa. Adulte. 20 février (V. & S. Vitzthum)

Belle observation... Nous ne connaissons que trois mentions le long de la côte atlantique, dont deux dans la région d'Agadir (Thévenot, Vernon & Bergier 2003); un oiseau de premier hiver a été cité de Dakhla le 07 décembre 2003 mais l'observation n'a pas été soumise à la CHM (R. Kaufmann *in Birding World* 16 : 495).

Goéland à ailes blanches – Iceland Gull *Larus glaucooides* AV (3/3, 1/1, 2/1)

2003 (03/26) **Souss**, embouchure Oued Souss. (Sub?)-adulte. 30 mai (C. Koller).

2004 (04/10) **Haha**, Aghroud, nord d'Agadir. Immature de troisième hiver. Photos. 11 janvier (H. Dufourny *et al.*)

L'observation 03/26 concerne l'oiseau homologué dans la session n°9 de la CHM (dossier 03/14 du 8 avril 2003, V. Schollaert *et al. in* Bergier *et al.* 2004), qui est donc resté près de deux mois au moins à l'embouchure de l'Oued Souss. Il est possible que l'observation du 11 janvier 2004 corresponde également à cet oiseau...



Larus glaucooides – Aghroud, 11 janvier 2004 (H. Dufourny *et al.*)

Perruche à collier – Ring-necked Parakeet
Psittacula krameri AV/RB? (1/1, 1/2)

2004 (04/29) **Plaines du Maroc Oriental**, Melilla. Couple. 14 mai (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Ce couple a été noté dans un parc public formant un milieu favorable à la reproduction. Un mâle avait été vu tout près, à Nador, le 28 janvier 2000 (dossier 00/07, Bergier *et al.* 2000c) par les mêmes observateurs. Mais quelle est l'origine de ces oiseaux ? Échappés de captivité ou en provenance d'une population férale espagnole ?

En Algérie, les quelques perruches à collier qui se sont échappées de captivité dans les jardins d'Alger à la fin des années 1980 se sont largement multipliées – leur nombre atteignait 200 oiseaux environ en 2004. L'espèce y a également été notée en plusieurs autres zones de la côte méditerranéenne... (Bendjoudi *et al.* 2005)

Traquet isabelle – Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* PM (36/41+, 2/2)

2004 (04/12a) **Tafilalt**, Oued Ziz, salines de Tamellaht. 27 mars (P. Yésou)

2004 (04/12b) **Tafilalt**, Oued Ziz, salines de Tamellaht. 28 mars (P. Yésou)

Encore une preuve que ce traquet est maintenant un migrateur de printemps régulier dans le sud-est du pays, comme l'ont signalé Schollaert & Willem (2001).

Hypolaïs pâle – Eastern Olivaceous Warbler
Hippolais pallida BM (0/0, 1/1)

2004 (04/18) **Tafilalt**, Kasbah Derkaoua. 22 avril (J.P. Delapré *et al.*)

Depuis la séparation de l'Hypolaïs pâle *H. pallida* d'avec l'Hypolaïs obscure *H. opaca*, la CHM a décidé d'analyser les mentions d'Hypolaïs pâles de la sous-espèce saharienne *reiseri* (Saharan Olivaceous Warbler) qui lui seraient fournies de manière à mieux cerner la zone de répartition de ce taxon, qui au Maroc semble limitée aux confins de l'extrême sud-est du pays.

La reproduction à l'auberge Derkaoua près de Merzouga a déjà été citée (3-4 couples à fin avril 2000 – Dally 2003), et d'autres observations y ont eu lieu (1 le 26 mars 2004 – Binns 2004).

Les éléments utiles au diagnostic de cette espèce sur le terrain (vocalisation, comportement, plumage et structure...) en comparaison de l'Hypolaïs obscure *H. opaca*, ont été détaillés par Svensson (2001) et Ottosson *et al.* (2005).




Figure 2. *Hippolais pallida reiseri* – Kasbah Derkaoua, Tafilalt, 22 avril 2004 (J.P. Delapré *et al.*)

Pie-grièche masquée – Masked Shrike *Lanius nubicus* AV (0/0, 1/1)

2004 (04/14) **Tafilalt**, Merzouga. Femelle (?) 1^o hiver. 30 mars (P. Yésou)

Belle observation bien détaillée de cette espèce orientale qui hiverne en Afrique subsaharienne orientale avec des prolongements jusqu'au Mali. Il n'y a que très peu de mentions en Afrique du Nord (2-3 en Libye ; aucune en Tunisie ; Algérie au XIX^e siècle et le 6 avril 1958, Heim de Balsac & Mayaud 1962, Isenmann *et al.* 2005, Isenmann & Moali 2000).

L'adulte se reconnaît facilement à son front, ses épaules et toutes les parties inférieures blanches, à l'exception de flancs orangés. Sa calotte, sa nuque, son manteau, le reste de ses

ailes et sa queue (bordées de rectrices externes blanches) sont noirs.

Pierre Yésou nous fait savoir que l'oiseau qu'il a observé est quasiment identique à celui photographié dans *Birding World* (Shand 2004 – photo 5) :

« ... c'est tout à fait le plumage de l'oiseau que j'ai vu, avec la queue noire contrastant avec les parties supérieures plus claires, le liseré des tertiaires très bien dessiné, l'absence de ton orangé sur la joue. Seule différence : mon oiseau montrait un masque beaucoup plus contrastant que celui de *Birding World*, qui est qualifié de femelle. Aurais-je donc vu un mâle ?... »

Il s'agit de la première observation au Maroc.



Liste des données non homologuées

Vautour moine – Black Vulture *Aegypius monachus* 1989 (89/02) Souss, Inchaden, Oued Massa, adulte, 27 avril. **Aigrette des récifs – Western Reef Heron** *Egretta gularis* 2002 (02/39) Haouz, canal de rocade, 15 km sud Marrakech, 2 adultes, photos, 23 février. **Goéland de la Baltique – Baltic Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus fuscus* 2003 (03/25) Plaines du Maroc Oriental, Beni Anzar, Nador, 6 adultes, 11 janvier. **Fuligule milouinan – Scaup** *Aythya marila* 2003 (03/31) Plaines du Maroc Oriental, Embouchure Oued Moulouya, femelle adulte, 21 décembre. **Aigle ravisseur – Tawny Eagle** *Aquila rapax* 2003 (03/33) Bas Draa, entre Goulimine et Tantan, 26-31 octobre. **Faucon de Barbarie – Barbary Falcon** *Falco pelegrinoides* 2004 (04/13) Tafilalt, Merzouga, adulte, 29 mars ; 2004 (04/19) Haut Atlas Occidental, Tizi-n-Tichka, adulte, 9 mars ; 2004 (04/20) Dadès-Draa, Palmeraie d'Oulad Driss, adulte, 10 mars ; 2004 (04/21) Dadès-Draa, Barrage de Tidri, adulte, 14 mars ; 2004 (04/22) Haha, Tamri, adulte, 27 avril. **Sterne arctique – Arctic Tern** *Sterna paradisaea* 2004 (04/28) Souss, Embouchure Oued Souss. 1 adulte et un juvénile. 28 avril.

Bibliographie

- Bendjoudi, D. ; Voisin, J.F. ; Doumandji, S. & Baziz, B.** 2005. Installation de la Perruche à collier *Psittacula krameri* (Aves, *Psittacidae*) dans l'Algérois et premières données sur son écologie trophique dans cette région. *Alauda* 73 : 329-334.
- Bergier, P. & Thévenot, M.** 2004. Les observations d'oiseaux néarctiques au Maroc (période 1900-2003). *Ornithos* 11 : 282-293.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & la CHM** 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1997. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 2. *Porphyrio* 9 : 165-173.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1998-99. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 3. *Porphyrio* 10-11 : 254-263.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000a. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 4. *Porphyrio* 12 : 36-46.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000b. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 5. *Porphyrio* 12 : 47-56.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2000c. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 6. *Porphyrio* 12 : 57-69.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 2002. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 7. www.ifrance.com/go-south, 9 pages et *Porphyrio* 13-14 : 1-9.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. et la CHM** 2003. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 8. www.ifrance.com/go-south, 9 pages et *Porphyrio* 13-14 : 10-19.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. et la CHM** 2004. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 9. *Go-south Bull.* 1 : 13-17.
- Binns, A.** 2004. *Morocco: Trip report and list 21 March-4 April 2004*. Jaeger Tours. Inéd.
- Charco, J. ; Jerez, D. & Cabo, J.M.** 1995. Structure qualitative, quantitative, trophique et phénologique de la communauté d'oiseaux aquatiques de la Sebkhia Bou-Areg. *Porphyrio* 7 : 5-80.
- Dally, A.** 2003. Saharan Olivaceous Warbler in Morocco. *Birding World* 16 : 475.
- Hazevoet, C.J.** 1997. Notes on distribution, conservation, and taxonomy of birds from the Cape Verde Islands, including records of six species new to the archipelago. *Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam*, 15: 89-100.
- Hazevoet, C.J.** 1999. Fourth report on birds from the Cape Verde Islands, including notes on conservation, and records on 11 taxa new to the archipelago. *Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam* 17 : 19-32.

- Heim de Balsac, H. & Mayaud, N.** 1962. *Les Oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique. Distribution géographique, Ecologie, Migrations, Reproduction.* Encyclopédie ornithologique X, Lechevalier, Paris. 487 pp.
- Isenmann, P. & Moali, A.** 2000. *Oiseaux d'Algérie/Birds of Algeria.* Soc. Etudes Ornith. Fr., Paris. 336 pp.
- Isenmann, P. ; Gaultier, T. ; El Hili, A. ; Azafzaf, H. ; Dleni, H. & Smart, M.** 2005. *Oiseaux de Tunisie/Birds of Tunisia.* Soc. Etudes Ornith. Fr., Paris. 432 pp.
- Martin, A. & Lorenzo, J.A.** 2001. *Aves del Archipelago canario.* F. Lemus Ed. La Laguna. 787 pp.
- Ottosson, U. ; Bensch, S. ; Svensson, L. & Waldenstrom, J.** 2005. Differentiation and phylogeny of the olivaceous warbler *Hippolais pallida* complex. *J. Ornithol.* 146 : 127-136.
- Porter, R.; Newell, D.; Marr, A. & Jolliffe, R.** 1997. Identification of Cape Verde Shearwater. *Birding World* 10: 222-228.
- Samraoui, B. & Houhamdi, M.** 2002. L'hivernage de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Algérie. *Alauda* 70 : 221-223.
- Schollaert, V. & Willem, G.** 2001. The status of Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* in Morocco. *Bull. African Bird Club* 8 : 136-137.
- Shand, R.** 2004. The Masked Shrike in Fife – a new British bird. *Birding World* 17 : 466-471.
- Svensson, L.** 2001. Identification of Western and Eastern Olivaceous, Booted and Sykes's Warblers. *Birding World* 14: 192-219.
- Tåning, A.V.** 1933. The winter quarters of the Phalaropes. *Ibis* 13: 132-133.
- Thévenot, M. ; Beaubrun, P. ; Baouab, R.E. & Bergier, P.** 1982. Compte-rendu d'ornithologie marocaine, année 1981. *Doc. Inst. Sci.*, Rabat, 7 : 120 pages.
- Thévenot, M. ; Vernon, J.D.R. & Bergier, P.** 2003. *The Birds of Morocco.* British Ornithologist Union Checklist Series: 20. 594 pages.