



# LES OISEAUX RARES AU MAROC

Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine  
Numéro 4 (1998)

## RARE BIRDS IN MOROCCO - Report of the Moroccan Rare Birds Committee # 4 (1998)

par Patrick BERGIER <sup>(1)</sup>, Jacques FRANCHIMONT <sup>(2)</sup>, Michel THEVENOT <sup>(3)</sup> et la Commission d'Homologation Marocaine.

### SUMMARY

In 1998, MRBC examined 50 records of which 34 were accepted. These included 4 records of species of Nearctic origin - 3 species of duck and one gull species. White-headed Ducks were recorded at two localities with hybrid Ruddy x White-headed Duck at one locality.

### INTRODUCTION

Le nombre de demandes d'homologation examinées en 1998 s'élève à 50, en augmentation sensible par rapport aux années précédentes. Les membres <sup>(4)</sup> de la Commission d'Homologation Marocaine (CHM) rappellent qu'il s'agit, par le biais de descriptions d'espèces rares ou peu connues au Maroc, de participer aux efforts entrepris par de nombreux autres pays relatifs à la problématique « oiseaux rares dans le Paléarctique », et d'accroître la connaissance générale sur l'avifaune marocaine. Ils remercient par avance tout observateur ayant rencontré une des espèces listées en Annexe du Rapport de la CHM N° 6 figurant dans ce Volume 12 de *Porphyrio* de bien vouloir en transmettre une description détaillée au

**Prof. Jacques FRANCHIMONT**  
**Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22**  
**50.000 MEKNES V.N. (MAROC)**

Dans ce quatrième rapport, une demande d'homologation présentait une observation réalisée en 1986, douze concernaient des observations de 1997 et 37 de 1998.

34 données ont été acceptées par la Commission. Une autre concernait manifestement *Bubo bubo ascalaphus*, espèce largement répandue au Maroc et non soumise à homologation. Les 15 autres n'ont pu être homologuées, la plupart par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations, de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées.

<sup>(1)</sup> 4 Avenue Folco de Baroncelli - 13210 SAINT REMY DE PROVENCE (France). Email : pbergier@yahoo.fr

<sup>(2)</sup> Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 - 50 000 MEKNES V.N. (Maroc)

<sup>(3)</sup> EPHE, Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 MONTPELLIER Cedex 5 (France)

<sup>(4)</sup> Patrick BERGIER, Hugues DUFOURNY, Ahmed EL GHAZI, Mostafa FAREH, Jacques FRANCHIMONT, Christian POUTEAU, Ahmad SAYAD, Valéry SCHOLLAERT, Michel THEVENOT, Rae VERNON.

Une demande d'homologation d'Aigrette (des récifs ou garzette sombre *Egretta gularis / garzetta*), particulièrement bien renseignée, a donné beaucoup de fil à retordre à la CHM. On trouvera ci-après une description détaillée de ce cas.

La vie de la CHM a été particulièrement riche d'événements en 1999. Mostafa FAREH est venu rejoindre ses rangs, portant à 10 le nombre des membres de la Commission ; Jacques FRANCHIMONT a été désigné comme représentant du Maroc pour l'African Bird Club, qui a par ailleurs accepté de publier dans son Bulletin une synthèse en Anglais des trois premiers rapports d'homologation, afin de toucher un plus large public (Bergier *et al.* 2000).

Enfin, les travaux sur l'avifaune marocaine se sont poursuivis et, en sus des travaux que l'on trouvera dans *Porphyrio*, nous avons noté les publications suivantes sorties de presse en 1997 - 1999 :

- **Aulagnier, S. ; Thévenot, M. & Gourvès, J.** 1999. Régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto alba* dans les plaines et reliefs du Maroc nord-atlantique. *Alauda* 67 : 323-336.
- **Bergier, P. ; Franchimont, J. & Thévenot, M.** 1999. Implantation et expansion géographique de deux espèces de Columbides au Maroc : la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*. *Alauda* 67 : 23-36.
- **Bowden, C.** 1998. Last chance for the Northern Bald Ibis. *World Birdwatch* 20 : 9-16.
- **Dawson, B., Ed.** 1999. The International Foundation for Conservation and Development of Wildlife. Annual Report, vol. 2 (1998-1999). Inezgane, Morocco, International Foundation for Conservation and Development of Wildlife.
- **El Agbani, M.A. & Dakki, M.** 1999. Recensement de la population de la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia* L.) au Maroc durant le printemps-été 1995. pp 69-80 in Schulz, H. (Ed) *White Storks on the up ?* Proc. Intern. Symp. on the White Stork. Hamburg 1996. NABU, Bonn.
- **El Kharrim, K. ; Sehhar, E.A. ; Belghyti, A. & Aguesse, P.** 1998. Analyse des variations géographiques du régime alimentaire du Moineau domestique *Passer domesticus* L. *Actes Inst. agron. vét.* (Maroc) 18 : 253-260.
- **El Kharrim, K. ; Sehhar, E.A., Belghyti, A. ; Ahami, A. & Aguesse, P.** 1997. Evaluation des dégâts sur les cultures céréalières à travers l'étude du régime alimentaire du Moineau domestique *Passer domesticus* L. dans la plaine du Gharb (Maroc). *Actes Inst. agron. vét.* (Maroc) 17 : 61-66.
- **Gonzalez-Solis, J. ; Ruiz, X. & Jover, L.** 1999. Fisheries and daily activity cycles of Audouin's *Larus audouinii* and Yellow-legged Gulls *Larus cachinnans* breeding at the Chaffarinas Islands (Moroccan coast). *Vogelwarte* 40 : 52-56.
- **Green, A.J. & El Hamzaoui, M.** 1998. The status and biology of threatened waterfowl in Morocco. TWSG News (*The Bulletin of the Threatened Waterfowl Specialist Group News*) 11 : 25-27.
- **Hamidi, S. & Bouariche, B.** 1998. Hivernage du Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) dans le nord-est du Maroc. *Alauda* 66 : 315-316.
- **Henry, P.-Y. & Gazave, E.** 1998. Attaques répétées d'une Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis elegans* envers un Sirli du désert *Alaemon alaudipes*: compétition ou kleptoparasitisme ? *Alauda* 66 : 255-256.

- **Laptikhovskii, V.V.** 1999. Seasonal changes of species composition, numbers, biomass and food consumption in seabirds in shelf and continental slope in Morocco (Language: Russian). *Zoologicheskyy Zhurnal* 78 : 1340-1346.
- **Marshall, H.D. & Baker, A.J.** 1999. Colonization history of Atlantic island common chaffinches (*Fringilla coelebs*) revealed by mitochondrial DNA. *Mol. Phylogenet. Evol.* 11 : 201-212.
- **Meyburg, B. U. ; Meyburg, C. & Barbraud, J. C.** 1998. Migration strategies of an adult Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* tracked by satellite. *Alauda* 66 : 39-48.
- **Papi, F. ; Apollonio, M. ; Vaschetti, B. & Benvenuti, S.** 1997. Satellite tracking of a White Stork from Italy to Morocco. *Behav. Processes* 39 : 291-294.
- **Prange, H.** 1999. Der Zug des Kranichs *Grus grus* in Europa. *Vogelwelt* 120 : 301-315.
- **Qninba, A.** 1999. *Les Limicoles (Aves, Charadrii) du Maroc : synthèse sur l'hivernage à l'échelle nationale et étude phénologique dans le site de Ramsar de Merja Zerga*. Thèse Doctorat d'Etat, Univ. Mohammed V, Rabat.
- **Qninba, A. ; Dakki, M. ; El-Agbani ; M.A., Benhoussa, A. & Thévenot, M.** 1999. Hivernage au Maroc des Gravelots et Pluviers (*Aves, Charadrii, Charadriinae*) et identification des sites d'importance internationale. *Alauda* 67 : 161-172.
- **Qninba, A. ; Thévenot, M. ; Dakki, M. ; Benhoussa, A. & El-Agbani, M.A.** 1998. Observations hivernales au Maroc du Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*. *Alauda* 66 : 113-116.
- **Renaudier, A.** 1998. Un Faucon crécerellette *Falco naumanni* capture un martinet *Apus sp.* au Maroc. *Nos Oiseaux* 45 : 108 et *Alauda* 66 : 166.
- **Rufino, R. ; Neves, R. & Pina, J.P.** 1998. Wintering waders in Dakhla Bay, Western Sahara. *Wader Study Group Bull.* 87 : 26-29.
- **Ruiz, X. ; Gonzales-Solis, J. ; Oro, D. & Jover, L.** 1998. Body size variation in Audouin's Gull *Larus audouinii*, a density-dependent effect ? *Ibis* 140 : 431-438.
- **Touti, J. ; Oumellouk, F. ; Bowden, C.G.R. ; Kirkwood, J.K. & Smith, K.W.** 1999. Mortality incident in Northern Bald Ibis *Geronticus eremita* in Morocco in May 1996. *Oryx* 33 : 160-167.
- **Vangeluwe, D. ; Handrinos, G. & Bulteau, V.** 1998. Le point sur le Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*. Où l'observer, comment l'identifier ? *Ornithos* 5 : 22-35.

## PRESENTATION DES DONNEES

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996).

La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique
- Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du Rapport de la CHM N° 6

pour les **espèces accidentelles**, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la

CHM et le nombre d'individus correspondants (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM).

- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date de création de la CHM (année 1998 exclue), et publiées dans les trois premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996, 1997 et 1998-99).

- les deux derniers représentent le nombre de données enregistrées par la CHM en 1998 et le nombre d'individus correspondant.

pour les **espèces rares ou mal connues**, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte dans le Rapport de la CHM N° 6), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres précisions si nécessaires, date(s) d'observation, observateur(s).
- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc », rappelée en Annexe du Rapport de la CHM N° 6.

## L'AIGRETTE SOMBRE DE MERZOUGA

Le 22 avril 1997, un groupe (**G1**) de 10 ornithologues menés par A. van den Berg découvre une Aigrette sombre à Merzouga, parmi un groupe de 7 Aigrettes garzettes typiques. Plusieurs excellentes photos sont enregistrées.

Deux jours plus tard, l'oiseau est détaillé par deux autres groupes, l'un (**G2**) de 5 personnes menées par T. Gullick, qui peuvent l'approcher jusqu'à 80 mètres, l'autre (**G3**) mené par N.J. Redman. L'Aigrette sombre se trouve alors en compagnie de 2 Aigrettes garzettes typiques.

Le tableau ci-dessous résume les descriptions détaillées transmises par ces 3 groupes. Les mentions portées en *italique* sont extraites *verbatim* des rapports d'observation.

	Groupe <b>G1</b> 22 avril 1997	Groupe <b>G2</b> 24 avril 1997	Groupe <b>G3</b> 24 avril 1997
Couleur générale	● <i>upperparts and underparts dark-grey, including elongated narrow dark-grey feathers on back and breast. Belly slightly paler grey than breast</i>	● <i>dark slaty black</i>	● <i>smoky-grey/black (much as dark phase Reef Egret)</i>
Apparence générale	● <i>same size and structure as accompanying Little Egrets</i> ● <i>no difference in walking or flight with Little Egrets</i>	● <i>different and more « slouched » stance (par rapport aux 2 Aigrettes garzettes typiques)</i>	● <i>same size and structure (que les 2 Aigrettes garzettes typiques)</i>
Bec	● <i>black</i> ● <i>at first sight, the bill seemed marginally longer (que chez les Aigrettes garzettes typiques); however, this was not confirmed by taking measurements from photographs and might be attributed to an illusionary effect caused by the facial pattern</i>	● <i>appearing heavier (par rapport aux 2 Aigrettes garzettes typiques) and more thick-billed with even a droopy effect to the dirty yellowish bill (not black)</i>	● <i>fairly slender as white birds, grey-black (no pale base). Culmen slightly curved but same as white birds. Bill not deep at base, nor blunt-tipped</i>
Jambes, pattes	● <i>tarsus black with some yellowish admixed towards ankle. Toes yellow. Claws black</i>	● <i>the black legs and yellow feet were common to all three birds (i.e. l'Aigrette sombre + les 2 garzettes typiques)</i>	● <i>legs dark brownish-black (grey upper-tibia) with yellowish feet (up to « ankle »), same as white birds. Legs not noticeably thicker or shorter than white birds</i>
Tête, gorge, cou	● <i>forehead white, mottled grey towards crown. Hind crown, nape and neck dark-grey. Dark lore. White feathers surrounding eye as broken eye-ring. Ear-coverts white, slightly mottled grey</i> ● <i>iris pale</i> ● <i>bare skin of face greyish</i>	● <i>there were whitish feathers from the chin to half way down the throat</i> ● <i>thicker neck was obvious (par rapport aux 2 Aigrettes garzettes typiques)</i>	● <i>throat and chin white</i>

Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● primaries dark-grey with much white at base. Secondaries dark-grey with some white mottling at base of outers. Tertiaries dark-grey with little white at base. Greater primary coverts largeley white with some dark-grey edges. Outer and two central greater coverts dark-grey with little white at base. Median, lesser and underwing-coverts dark-grey. Faint brownish hue on upperwing-coverts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● in flight, the dark Egret showed whitish wing patches in area of primary wing coverts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● in flight several primaries showed white webs giving curious pied effect</li> </ul>
Queue « Aigrettes »	<ul style="list-style-type: none"> <li>● dark-grey</li> <li>● similar ornamental plumes (que les Aigrettes garzettes typiques)</li> <li>● strap-like nape feathers longer than bill</li> <li>● thanks to direct comparision, both in the field and on photographs, it was possible to ascertain that the bird's bill shape, leg length and colour of bare parts were identical to Little Egret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● dark head plumes (two) as white birds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In summary, bird appeared exactly as white birds in size, proportions, bare parts coloration, differing only in colour of plumage</li> </ul>
Déterminé comme	<i>Egretta sp</i> , phase sombre	<i>Egretta gularis</i>	<i>Egretta garzetta</i> , phase sombre

Il est frappant de remarquer les différences de descriptions provenant des groupes G1 et G3 d'une part, et du groupe G2 d'autre part, concernant l'apparence générale (« jizz ») et le bec, à tel point que la possibilité que les descriptions se rapportent à 2 oiseaux différents a été évoquée... (mais l'hypothèse a finalement été rejetée ; les groupes G2 et G3 ont vu l'oiseau le même jour...).

Les analyses des 10 membres de la CHM<sup>(1)</sup>, complétées par des commentaires d'Yves Kayser et Philippe J. Dubois (que nous remercions grandement pour leur collaboration), ont évidemment livré des résultats contradictoires, et nous proposons que l'oiseau de Merzouga ne soit (pour le moment ?) pas déterminé au niveau spécifique, restant donc *Egretta sp*.

Cette observation a donné lieu à un article de Van den Berg dans *Dutch Birding* (1999).

## LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

### PLONGEON IMBRIN - GREAT NORTHERN DIVER *Gavia immer* - AV (3/3 - 0/0 - 1/1)

**1986 (86/1) Souss** - Embouchure Oued Souss. 1° hiver. 14-20 décembre. Photo (H. KLEMOLA & J. KOMI)

L'espèce a été citée comme accidentelle dans le Détroit de Gibraltar (Irby 1895, Finlayson 1992), mais nous n'y connaissons qu'une donnée documentée dans les eaux marocaines (7 septembre 1993 - F. Cuzin). Il n'y avait à ce jour que deux observations le long de la côte atlantique : dans le port d'Agadir le 30 décembre 1989 (O. Armini *et al.*) et à Merja Zerga de fin décembre 1990 à début janvier 1991 (Pouteau *et al.* 1992). L'oiseau de 1986 a séjourné au moins un mois à l'embouchure de l'Oued Souss (déjà noté le 20 novembre par N.J. Redman).

### OCEANITE FREGATE - WHITE-FACED STORM PETREL *Pelagodroma marina* - AV (4/33+ - 0/0 - 1/1)

**1997 (97/17) Souss** - 24 miles nautiques au large d'Agadir. 31 mars. Photo (K. CARLSSON *et al.*)

Nous ne connaissons que 5 mentions de cette espèce qui niche à Madère, aux Canaries et au Cap Vert ; toutes ont eu lieu au large, au sud de la latitude d'Agadir, 30°30'N. Nul doute que des sorties en mer permettraient de consigner plus souvent cet Océanite. La photo de cet oiseau a été publiée dans *Birding World* (1997, vol. 10, p. 134).

<sup>(1)</sup> pour *E. gularis* : 5 votes positifs, 3 nuls et 2 négatifs au 1° tour, 3 votes positifs, 5 nuls et 2 négatifs au 2° tour

**GRANDE AIGRETTE - GREAT WHITE EGRET *Egretta alba* - PM, OW (1/1 - 1/1)****1998 (98/34) Rharb** - Merja Bargha. 26 novembre (P. WIPRACHTIGER & A. EL GHAZI)

L'espèce continue son expansion en Europe, mais n'avait plus été notée depuis 1995 au Maroc (Bergier *et al.* 1996). Il s'agit de la 38<sup>ème</sup> donnée pour le pays.

**SARCELLE D'HIVER D'AMERIQUE - GREEN-WINGED TEAL *Anas crecca carolinensis* - AV (2/2 - 0/0 - 1/1)****1998 (98/1) Souss** - Oued Massa. Mâle. 28 février (C. BOWDEN & G. MANNERS)

Deuxième mention à l'embouchure de l'Oued Massa, où un autre mâle avait été observé du 23 au 27 avril 1984 (T. Axelsen, G. Balança, A.W. Clarke *et al.*). La troisième donnée de cette espèce américaine a été enregistrée le 13 avril 1959 au Barrage d'Imfout sur l'Oued Oum-Er-Rbia (Frété 1959).

**SARCELLE A AILES BLEUES - BLUE-WINGED TEAL *Anas discors* - AV (13/20 - 1/1 - 1/1)****1998 (98/2) Souss** - Oued Massa. Mâle. 28 février (C. BOWDEN & G. MANNERS)

Voici la sixième donnée à l'embouchure de l'Oued Massa, sur les quinze qui ont été enregistrées à ce jour au Maroc ! La date est classique du schéma d'apparition de l'espèce, les observations étant concentrées en janvier (5), février (2) et mars (3) puis en octobre (2), les mois d'avril, mai et décembre n'ayant livré qu'une mention.

**FULIGULE A BEC CERCLE - RING-NECKED DUCK *Aythya collaris* - AV (9/13 - 1/1 - 1/1)****1998 (98/36) Haut Atlas oriental** - Barrage Hassan Addakhil. 25 janvier. Mâle (P. LANSDOWN)

Deuxième mention sur ce lac de barrage, bien loin des côtes atlantiques... ; un couple y avait déjà séjourné du 11 décembre 1980 au 1 février 1981 (R. Destre).

**ERISMATURE A TETE BLANCHE - WHITE-HEADED DUCK *Oxyura leucocephala* - FB, AV (0/0 - 4/4)****1997 (97/18) Rharb** - Merja Bargha. Mâle. 30 mai & 28 juin. Photo (J.C. CASTRO ROMAN *et al.*)**1998 (98/6) Saïs** - Douyiet. Mâle. 10 avril (J. FRANCHIMONT, A. EL GHAZI *et al.*)**1998 (98/15) Saïs** - Douyiet. Mâle. 25 juillet (J. FRANCHIMONT *et al.*)**1998 (98/33) Saïs** - Douyiet. Mâle. 23 décembre (J. FRANCHIMONT *et al.*)

Voici enfin des observations récentes d'une espèce qui n'avait plus été notée depuis longtemps au Maroc. Rappelons que l'Erismature à tête blanche se reproduisait dans les marais du Rharb jusqu'à la fin des années 1930 au moins, mais qu'on ne connaissait que 4 mentions dans les années 1950-1970, et une seule depuis (c. 10 au Barrage Idriss I<sup>er</sup> dans le Prérif, en juillet et août 1983 - R. Sbihi) ! Les observations 98/6, /15 et /33 concernent probablement le même oiseau qui aura séjourné à Douyiet.

**ERISMATURE ROUSSE X ERISMATURE A TETE BLANCHE - RUDDY X WHITE-HEADED DUCK *Oxyura jamaicensis x leucocephala* - AV (0/0 - 3/4 - 2/5)****1998 (98/16) Saïs** - Douyiet. 3 mâles. 25 avril (J. FRANCHIMONT & A. EL GHAZI)**1998 (98/32) Saïs** - Douyiet. 2 femelles. 23 décembre (J. FRANCHIMONT *et al.*)

Après les observations d'un hybride en 1996 puis de 3 en 1997, ce sont 5 oiseaux qui ont été notés à Douyiet cette année. Ceci ne laisse évidemment rien augurer de bon

pour une éventuelle réimplantation de l'Erismature à tête blanche « pure » au Maroc....

**AIGLE RAVISSEUR - TAWNY EAGLE *Aquila rapax* - RB (0/0 - 1/1)**

**1998 (98/9) Souss** - Tafingoult. 2 mai (J. FRANCHIMONT & A. EL GHAZI)

Première mention depuis 1997, date à laquelle la CHM a décidé d'inclure cet oiseau dans la liste des espèces à soumettre à homologation. Rappelons que cet aigle se reproduisait autrefois dans la plus grande partie du Maroc non désertique, y compris en montagne dans le Moyen Atlas (dernière mention : couple construisant le nid, Dayet Ifer, 5 avril 1981 - Thévenot *et al.* 1982). Il ne semble plus aujourd'hui confiné qu'au Souss et aux zones adjacentes, où les dernières mentions de reproduction datent de 1980 (Thévenot *et al.* 1981), 1990 (H. Duperrex & L. Maumary) et 1992 (Eadson 1993).

**FAUCON DE BARBARIE - BARBARY FALCON *Falco pelegrinoides* - RB mal connu (14/15 - 3/3)**

**1998 (98/11) Tarfaya** - 5 km au sud de l'embouchure de l'Oued El Ouaâr. Immature. 11 août (J. FRANCHIMONT & F. TOUATI MALIH)

**1998 (98/12) Tarfaya** - 16 km au sud de Tantan Plage. Immature. 11 août (J. FRANCHIMONT & F. TOUATI MALIH)

**1998 (98/13) Tarfaya** - 11 km au sud de Sidi Ifni. Immature. 12 août (J. FRANCHIMONT & F. TOUATI MALIH)

Encore une belle série de Faucons de Barbarie cette année. Dommage que de nombreuses autres descriptions qui nous sont parvenues n'aient pas été suffisamment détaillées.... Les 17 données acceptées à ce jour par la CHM font apparaître une répartition méridionale, semi-désertique, limitée au nord par les versants sud du Haut Atlas (des Haha à l'ouest au Haut Atlas Oriental à l'est); des zones de chevauchement avec la sous-espèce *minor* du pèlerin apparaissent dans le Tafilalet, alors que *pelegrinoides* vient en contact avec la forme « *atlantis* » sur la côte des Haha. Des observations détaillées en présence/absence manquent cependant encore sur une bonne partie du Maroc non désertique, en particulier dans les Atlas, induisant un possible biais dans notre perception actuelle de la répartition.

**MAROUETTE PONCTUEE - SPOTTED CRAKE *Porzana porzana* - PM, OW (0/0 - 1/7)**

**1998 (98/4) Souss** - Oued Massa. Au moins 7 oiseaux. 28 février (C. BOWDEN & G. MANNERS)

L'observation concerne probablement le début du passage printanier, qui se poursuit jusqu'aux premiers jours de mai. Si les mentions printanières sont assez nombreuses, nous ne connaissons que 9 mentions hivernales, de fin novembre à mi-février, et 9 mentions au passage d'automne. Rappelons que la Marouette ponctuée migre sur un large front : plusieurs mentions ont par exemple été obtenues dans le Tafilalet (Destre 1984).

**MAROUETTE POUSSIN - LITTLE CRAKE *Porzana parva* - PM (0/0 - 2/15)**

**1998 (98/10) Souss** - Oued Massa. Au moins 5 mâles et 7 femelles. 16 avril (H. DUFOURNY *et al.*)

**1998 (98/24) Souss** - Oued Massa. Au moins 1 mâle le 26 mars, 2 femelles le 27 mars (E. de THIERSANT *et al.*)

Mises à part quelques observations de fin janvier et février, la plupart des contacts sont obtenus en mars et avril. Massa est une des zones qui ont fourni le plus de mentions, mais l'oiseau traverse également le Sahara plus à l'est et a été noté jusque dans le Sahara Oriental près de Figuig (Smith 1968). Nous ne connaissons aucune donnée d'automne.

**MAROUETTE DE BAILLON - BAILLON'S CRAKE *Porzana pusilla* - PM, BM, OW (0/0 - 1/1)**

**1997 (97/20) Plaines du Maroc Oriental** - Barrage Mechra Homadi. Mâle adulte. 23 mars (D. JEREZ ABAD & R. RAMIREZ ESPINAR)

La date coïncide avec celle du passage printanier, mais la reproduction a été décelée dans la région (Marais de Ras-el-Ma dans les années 1950, estuaire de la Moulouya en 1989 - Brosset 1956 & 1990).

**BECASSEAU VIOLET - PURPLE SANDPIPER *Calidris maritima* - AV (8/12 - 0/0 - 1/1)**  
**1998 (98/14) Zaër** - Skhirat plage. 6 avril (M. GROSSELET & J. FONDERFLICK)

Neuvième mention détaillée de l'espèce au Maroc. A l'exception de 2 oiseaux notés dans le Détroit de Gibraltar le 24 décembre 1986 (A. Cambelo), les autres données ont été obtenues sur la côte nord-atlantique, entre Tanger et Sidi-Moussa. Il s'agit ici de l'observation la plus tardive, les autres ayant été enregistrées d'un 11 octobre à un 5 février.

**COURLIS A BEC GRÊLE - SLENDER-BILLED CURLEW *Numenius tenuirostris* - WV (0/0 - 1/1)**

**1998 (98/5) Rharb** - Merja Zerga. Au moins un oiseau. 11 février (M. & A. PARENT)

Le Courlis à bec grêle n'avait plus été noté depuis l'hiver 1994-95.... Le statut de l'espèce au Maroc a fait l'objet de plusieurs travaux depuis une dizaine d'années ; on se reportera notamment aux publications de Van den Berg (1988 & 1990), Thévenot (1989) et Gretton (1991).

**MOUETTE DE SABINE - SABINE'S GULL *Larus sabini* - PM, OW (1/1 - 2/7)**

**1998 (98/17) Souss** - Embouchure Oued Souss. Immature 1<sup>o</sup> hiver/été. 17 avril (H. DUFOURNY *et al.*)

**1998 (98/25) Haha** - Embouchure Oued Tinkert. 6 oiseaux. 29 avril. Photo (P. MORRIS *et al.*)

Les dates d'observations sont cohérentes du schéma migratoire printanier de l'espèce, qui se déroule principalement en avril et mai au large de la côte atlantique.

**GOELAND A BEC CERCLE - RING-BILLED GULL *Larus delawarensis* - AV (19/19 - 6/7 - 1/1)**

**1998 (98/8) Souss** - Embouchure Oued Souss. Immature deuxième été. 17 avril (H. DUFOURNY *et al.*)

21 des 27 oiseaux notés étaient immatures. La date d'observation s'accorde avec le schéma de contact au Maroc (13 mentions en hiver, 9 de mars à mai, 2 en juillet-août et 2 en octobre-novembre).

**GOELAND CENDRE - COMMON GULL *Larus canus* - WV (5/5 - 5/9+)**

**1998 (98/29) Souss** - Embouchure Oued Souss. 2 adultes le 29 avril, 1 le 30 avril (J.D.R. VERNON)



**1997 (97/24) Souss** - Embouchure Oued Souss. 22 & 31 janvier (M. LEIVO & H. KONTKANEN)

**1998 (98/31) Souss** - Embouchure Oued Souss. 15 avril : 1 adulte + 1 immature deuxième été +1 immature premier été ; 16-18 avril : 1 adulte + 1 immature premier été ; 23 & 25 novembre : 1 immature premier hiver ; 30 novembre : 1 adulte (H. DUFOURNY *et al.*)

**1998 (98/31bis) Haha** - Entre Agadir et Cap Rhir. 23 novembre : 1 imm premier hiver (H. DUFOURNY *et al.*)

La présence du Goéland cendré le long de la côte atlantique marocaine - et particulièrement dans la région du Souss - est maintenant bien connue. Un article en préparation détaillera les données obtenues. A partir de 1999, seules les mentions de cette espèce dans le Détroit de Gibraltar et sur la côte méditerranéenne sont à soumettre à la CHM.

**GOELAND MARIN - GREAT BLACK-BACKED GULL *Larus marinus* - WV (0/0 - 1/1)**

**1997 (97/25) Souss** - Embouchure Oued Souss. Immature. 31 janvier (M. LEIVO & H. KONTKANEN)

Le Goéland marin n'a été que rarement mentionné au Maroc jusqu'aux années 1960 mais près de 70 observations ont été relevées depuis 1964, tout au long de la côte atlantique du Détroit de Gibraltar jusqu'aux frontières sud du pays.

**HIBOU DES MARAIS - SHORT-EARED OWL *Asio flammeus* - WV, PM (0/0 - 1/1)**

**1998 (98/37) Souss** - Embouchure Oued Souss. 24 novembre (H. DUFOURNY *et al.*)

L'espèce, qui hiverne jusqu'au Mali et au Sénégal, n'est qu'un migrateur rarement observé au Maroc. Le passage d'automne a été décelé en septembre (2 mentions) et surtout en novembre (8 mentions, incluant celle-ci).

**MARTINET UNICOLORE - PLAIN SWIFT *Apus unicolor* - AV, OB?, WV? (0/0 - 1/6)**

**1998 (98/30) Haha** - 3 km nord Taghazout. c. 6. 29 avril (J.D.R. VERNON)

Cette observation vient appuyer l'hypothèse de la nidification de ce martinet sur la côte atlantique des Haha ; rappelons que l'espèce était encore il y a peu de temps considérée comme endémique des îles de Madère et des Canaries. Depuis les premières observations de « petits martinets sombres » le long de la côte atlantique du Maroc en 1962 par K.D. Smith, la présence du Martinet unicolore est régulièrement rapportée de Tamri à Tarfaya ; cependant, il n'existe toujours pas de preuve formelle de l'appartenance spécifique de ces « petits martinets sombres » (spécimens trouvés morts ou capturés au filet).

**TRAQUET ISABELLE - ISABELLINE WHEATEAR *Oenanthe isabellina* - AV (17/20 - 1/1 - 1/1)**

**1997 (97/28) Dadès-Draa** - Ouarzazate. 25 janvier (M. LEIVO & H. KONTKANEN)

Donnée précoce pour ce traquet oriental... Les 19 mentions connues viennent principalement du Tafilalt (8), mais aussi du Dadès-Draa (5), du Bas Draa (4), du Sarhro (1) et du Wadi Ad-Deheb (1), et sont surtout printanières : 17 ont eu lieu entre février et avril, 2 seulement (incluant celle-ci) sont de janvier.

**PHRAGMITE AQUATIQUE - AQUATIC WARBLER *Acrocephalus paludicola* - PM (0/0 - 1/1)**

**1998 (98/28) Haha** - Tamri. Immature premier hiver. 29 octobre (D. WALSH & C. EDGINTON)

Autrefois commun aux deux passages, le Phragmite aquatique est devenu un migrateur rare depuis les années 1960, surtout noté au printemps. Les 28 mentions récentes ont été enregistrées en février (4), mars (8) et avril (12), puis en septembre (1) et octobre (3, incluant celle-ci), mais Walter (1968) en signale des captures par les Faucons d'Eléonore d'Essaouira dès le 23 août.

**FAUVETTE BABILLARDE - LESSER WHITETHROAT *Sylvia curruca* - PM, OW (0/0 - 1/1)**

**1998 (98/7) Anti Atlas Occidental - Oued Noun. 5 mai (J. FRANCHIMONT & A. EL GHAZI)**

Il s'agit d'une des données printanières les plus tardives, les 29 mentions précédentes ayant été enregistrées d'un 4 février à un 8 mai (février : 2, mars : 4, avril : 21, mai : 2).



**LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES**

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* - 1998 (98/35) Souss - Oued Massa. 21 janvier. Juv.**

**PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* - 1998 (98/3) Souss - Oued Massa. Subadulte. 28 février.**

**PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* - 1997 (97/21) Haha - Cap Rhir. 2 oiseaux. 1 février. 1997 (97/22) Haha - Cap Rhir. 3 oiseaux. 2 février.**

**OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa* - 1997 (97/23) Haha - Cap Rhir. 21 janvier.**

**AIGRETTE DES RECIFS *Egretta gularis* - 1997 (97/19) Tafilalt - Merzouga. Phase sombre. 22-25 avril. Photos. Voir commentaires ci-avant.**

**FAUCON DE BARBARIE *Falco pelegrinoides* - 1998 (98/19) Moyenne Moulouya - Missouri. 19 août. 1998 (98/20) Souss - Aoulouz. Couple + 1 mâle. 25 mars. 1998 (98/21) Moyen Draa - Iriki. Couple. 31 mars. 1998 (98/22) Dadès-Draa - Tizi Beni-Selmane. 1-2 avril. 1998 (98/27) Sarhro - Tagdilt. 26 avril.**

**MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* - 1998 (98/23) Souss - Oued Massa. 26 et 27 mars.**

**MOUETTE DE SABINE *Larus sabini* - 1998 (98/26) Haha - Cap Rhir. 2 oiseaux. 1 mai.**

**HIBOU GRAND DUC *Bubo bubo* - 1998 (98/18) Moyenne Moulouya - Missouri. 13 et 22 août (l'observation concerne *Bubo b. ascalaphus*, qui n'est pas à soumettre à la CHM).**

**MARTINET UNICOLORE *Apus unicolor* - 1997 (97/26) Souss - Oued Massa. 11 oiseaux. 21 janvier. 1997 (97/27) Rharb - Sidi Bou-Rhaba. 80 oiseaux. 30 janvier.**

**BIBLIOGRAPHIE CITEE**

**Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & la CHM 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.**

- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1997. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 2. *Porphyrio* 9 : 165-173.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM** 1998-99. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 3. *Porphyrio* 10-11 : 254-263.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M.** 1999. Implantation et expansion géographique de deux espèces de Columbides au Maroc : la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*. *Alauda* 67 : 23-36.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & the MRBC** 2000. Rare Birds in Morocco : Report of the Moroccan Rare Birds Committee (1995-1997). *Bull. African Bird Club* 7 : 18-28.
- Brosset, A.** 1956. Les oiseaux du Maroc oriental de la Méditerranée à Berguent. *Alauda* 24 : 161-205.
- Brosset, A.** 1990. L'évolution récente de l'avifaune du nord-est marocain : pertes et gains depuis 35 ans. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)* 45 : 237-245.
- Destre, R.** 1984. *Les oiseaux du Tafilalt (Sud-Est marocain) : étude biogéographique et écologique*. Thèse Univ. Montpellier.
- Duff, A.G.** 1979. Souchets du Cap *Anas smithii* au Maroc. *Alauda*, 47 : 216-217.
- Eadson, T.** 1993. Observation d'un couple nicheur d'Aigles ravisseurs (*Aquila rapax*) dans la vallée du Sous. *Porphyrio* 5 : 52-53.
- Finlayson, C.** 1992. *Birds of the Straits of Gibraltar*. T. & A.D. Poyser, London. 534 pp.
- Frété, P.** 1959. Capture au Maroc d'une Sarcelle d'hiver américaine *Anas crecca carolinensis* Gmelin. *Alauda* 27 : 231-232.
- Gretton, A.** 1991. The ecology and conservation of the Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*). *I.C.B.P. Monograph*. 6 : 1-158.
- Irby, L. H.** 1895. *The Ornithology of the Straits of Gibraltar*. Taylor & Francis, London.
- Pouteau, C. ; Franchimont, J. & Sayad, A.** 1992. Chronique ornithologique du G.O.M.A.C. pour 1991. *Porphyrio*, 4 : 39-117.
- Smith, K. D.** 1968. Spring migration through southeast Morocco. *Ibis* 110 : 452-492.
- Thévenot, M.** 1989. L'hivernage du Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris* Vieillot au Maroc. *Alauda* 57 : 47-59.
- Thévenot, M. ; Bergier, P. & Beaubrun, P.** 1981. Compte-rendu d'ornithologie marocaine, année 1980. *Doc. Inst. Scient.*, Rabat, 6 : 93 pp.
- Thévenot, M. ; Beaubrun, P. ; Baouab, R.E. & Bergier, P.** 1982. Compte-rendu d'ornithologie marocaine, année 1981. *Doc. Inst. Scient.*, Rabat, 7 : 120 pp.
- Van den Berg, A.B.** 1988. Identification of Slender-billed Curlew and its occurrence in Morocco in winter of 1987-88. *Dutch Birding* 10 : 44-53.
- Van den Berg, A.B.** 1999. Dark-morph egret in Morocco in April 1997. *Dutch Birding* 21 : 8-15.
- Van den Berg, A.B.** 1990. Habitat of Slender-billed Curlews in Morocco. *British Birds* 83 : 1-7.
- Walter, H.** 1968. Zur Abhängigkeit des Eleonorenfalken (*Falco eleonora*) vom mediterranen Vogelzug. *J. Ornithol.* 109 : 323-365.